



























ENDURBÆTTUR GREININGARLYKILL AÐ *SPHAGNUM*-TEGUNDUM

| | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | Greinablöð hettulaga í endann | 2 |
| 1* | Greinablöð ydd eða tennt | 7 |
| 2 | Stöngulblöð >1 mm. Greinar í kalli mislangar | 3 |
| 2* | Stöngulblöð <0,7 mm. Greinar í kalli jafn langar | <i>S. compactum</i> |
| 3 | Glærfrumur greinablaða hrjúfar að innanverðu. Sprotar aldrei rauðir (e.t.v. gulrauðir) | 4 |
| 3* | Glærfrumur greinablaða sléttar að innanverðu. Sumar tegundir rauðar | 5 |
| 4 | Glærfrumur greinablaða oftast með ræmur að innanverðu. Greinablöð aðlæg og greinar yddar | <i>S. affine</i> |
| 4* | Glærfrumur neðarlega í greinablöðum með vörtur að innanverðu. Greinablöð oft útstæð og greinar snubbóttar | <i>S. papillosum</i> |
| 5 | Sprotar rósrauðir; í skugga eru a.m.k. rauðir flekkir á stöngli. Grænfrumur greinablaða innilokaðar, sporlaga | <i>S. divinum</i> |
| 5* | Stönglar og sprotar ekki rauðir. Grænfrumur greinablaða ekki greinilega innilokaðar | 6 |
| 6 | Grænfrumur greinablaða spólulaga í þverskurði, heldur breiðari við efra borð blaða | <i>S. centrale</i> |
| 6* | Grænfrumur greinablaða þríhyrndar eða dropalaga, ná oft út að efra borði .. | <i>S. palustre</i> |
| 7 | Kollur rauðleitur eða a.m.k. slær rauðum lit á greinar og stöngul | 8 |
| 7* | Kollur grænn, gul- eða brúnleitur | 12 |
| 8 | Greinablöð í gereinilegum röðum. Jafnan 2 útstæðar greinar. Í fremri hluta blaðs á neðra borði eru mjög lítil göt umlukt þykkum styrktarhring | <i>S. warnstorffii</i> |
| 8* | Greinablöð ekki í röðum | 9 |
| 9 | Stöngulblöð >2 mm. Sprotar ljósrauðleitir | <i>S. angermanicum</i> |
| 9* | Stöngulblöð <2 mm. Sprotar greinilega rauðir | 10 |
| 10 | Greinar í kalli mynda reglulega 5 arma stjörnu, sé horft ofan á kollinn | <i>S. russowii</i> |
| 10* | Greinar í kalli mynda ekki 5 arma stjörnu, sé horft ofan á kollinn | 11 |
| 11 | Stöngulblöð með totu í endann. Málmgljái á þurrum sprotum | <i>S. subnitens</i> |
| 11* | Stöngulblöð ekki með totu í endann. Enginn málmgljái | <i>S. capillifolium</i> |
| 12 | Neðri hluti stönguls dökkur | 13 |
| 12* | Neðri hluti stönguls ljós | 23 |


| | | |
|-----|--|------------------------|
| 13 | Endasproti í kolli greinilegur | 14 |
| 13* | Endasproti í kolli ógreinilegur | 16 |
| 14 | Greinablöð í röðum. Stöngulblöð stutt og breið; lengd 1-1,5 x breidd; breiðust fremst og allur framendi trosnaður | S. lindbergii |
| 14* | Greinablöð ekki í röðum. Stöngulblöð aflöng; lengd 2 x breidd; lítið eða ekkert trosnuð fremst | 15 |
| 15 | Engar aðlægar greinar. Útstæðar greinar snubbóttar, beinar eða lítið eitt bognar. Stöngul- og greinablöð lík, bæði að lögun og frumugerð | S. platyphyllum |
| 15* | Með aðlægar greinar. Útstæðar greinar mjóar og beinar. Stöngul- og greinablöð ólík, | S. teres |
| 16 | Greinar í kolli bognar. Í glærfrumum greinablaða eru oftast tvær raðir af mörgum litlum götum með veggjum | 17 |
| 16* | Greinar í kolli beinar. Í glærfrumum greinablaða eru engin eða fáein göt | 20 |
| 17 | Stöngulblöð 0,9-2,7 mm | 18 |
| 17* | Stöngulblöð 0,4-1,3 mm | 19 |
| 18 | Stöngulblöð 0,9-1,5 mm. Göt á glærfrumum á framhluta stöngulblaða fleiri á efra borði en á neðra borði | S. inudatum |
| 18* | Stöngulblöð 1,3-2,7 mm. Göt á glærfrumum á framhluta stöngulblaða fleiri á neðra borði en á efra borði | S. auriculatum |
| 19 | Stöngulblöð 0,4-0,9 mm. Stöngull klæddur 1 lagi af glærfrumum (sjaldan 2) ... | S. subsecundum |
| 19* | Stöngulblöð 0,7-1,3 mm. Stöngull klæddur 2 eða 3 lögum af glærfrumum | S. contortum |
| 20 | Framendi greinablaða stendur þvert út. Stöngulblöð 1,7-2,0 mm | S. squarrosus |
| 20* | Greinablöð lítið eða ekkert útstæð. Stöngulblöð 0,9-1,7 mm | 21 |
| 21 | Stöngulblöð hanga niður | S. inudatum |
| 21* | Stöngulblöð upprétt | 22 |
| 22 | Sprotar án málmgljáa | S. fuscum |
| 22* | Sprotar með málmgljáa. Endi stöngulblaða pípulaga | S. subnitens |
| 23 | Framendi greinablaða stendur þvert út | 24 |
| 23* | Framendi greinablaða aðlægur eða lítið útréttur | 25 |
| 24 | Stöngulblöð 1,7-2,0 mm. Blaðoddur greinablaða mjór, lítill eitt þverstýfður og lítilllega tenntur. Útstæðar greinar yddar | S. squarrosus |
| 24* | Stöngulblöð 0,5-0,7 mm. Blaðoddur greinablaða breiður, þverstýfður og með nokkrar tennur. Útstæðar greinar snubbóttar | S. strictum |
| 25 | Stöngulblöð að mestu upprétt. Grænfrumur greinablaða í þverskurði breiðastar við efra borð blaðs eða eggлага | 26 |

| | | |
|-----|--|--|
| 25* | Stöngulblöð útstæð eða hangandi. Grænfrumur greinablaða í þverskurði breiðastar við neðra borð blaðs eða egg laga 32 | |
| 26 | Endasproti lítil eða greinilegur. Stöngulblöð lítið eða mikið trosnuð í endann 27 | |
| 26* | Endasproti enginn eða lítil. Stöngulblöð lítið eða ekkert trosnuð í endann 30 | |
| 27 | Stöngulblöð nær rétthyrnd 28 | |
| 27* | Stöngulblöð egg laga S. angermanicum | |
| 28 | Lengd stöngulblaða meiri en breiddin, aðeins trosnuð í bláendann 29 | |
| 28* | Stöngulblöð álíka löng og breið, trosnuð í endann og niður með hliðum S. fimbriatum | |
| 29 | Stöngulblöð 1,1-1,4 mm, trosnuð aðeins í bláendann. Oft rauður eða rauðleitur litur á greinum og stöngli S. russowii | |
| 29* | Stöngulblöð 0,8-1,3 mm, allur framhluti trosnaður. Aldrei rauður litur S. girgensohnii | |
| 30 | Greinablöð í greinilegum röðum. Göt í framhluta greinablaða á neðra borði lítil og umlukt stoðhringjum S. warnstorffii | |
| 30* | Greinablöð ekki í greinilegum röðum. Göt án stoðhringja 31 | |
| 31 | Kollur hvelfdur séður frá hlið. Án málmgljáa S. capillifolium | |
| 31* | Kollur flatur séður frá hlið. Með málmgljáa S. subnitens | |
| 32 | Stöngulblöð sýld í endann, oft niður að miðju. Endasproti greinilegur S. riparium | |
| 32* | Stöngulblöð ekki sýld. Endasproti ógreinilegur 33 | |
| 33 | Stöngulblöð útstæð og kúpt. Ein aðlæg grein 34 | |
| 33* | Stöngulblöð hangandi eða útstæð og lítið kúpt. Oftast 2 aðlægar greinar 35 | |
| 34 | Greinablöð egg laga, breiðust um miðju. Stöngulblöð lík greinablöðum S. tenellum | |
| 34* | Greinablöð breiðust neðan miðju. Stöngulblöð styttri og breiðari en greinablöð ... S. balticum | |
| 35 | Aðlægar greinar mun lengri en útstæðar. Stöngulblöð stutt, 0,5-0,8(-1,0) mm, snubbótt, hangandi S. angustifolium | |
| 35* | Aðlægar greinar varla lengri en útstæðar 36 | |
| 36 | Greinablöð sveigð til hliðar. Glærfrumur greinablaða með lítil göt í röðum meðfram veggjum á neðra borði. Stöngull klæddur 2 eða 3 lögum af glærfrumum S. contortum | |
| 36* | Greinablöð sveigð eða bein. Göt í glærfrumum greinablaða ekki í röðum. Glærþekja um stöngul lítil eða greinileg 37 | |
| 37 | Stöngulblöð álíka löng og breið, nærri þríhyrnd, ydd eða virðast með broddi (blaðrendur innundnar). Greinablöð >1,5 mm S. fallax | |
| 37* | Stöngulblöð snubbótt eða bogadregin. Greinablöð <1,5 mm 38 | |
| 38 | Innri hluti kolls með stuttar greinar, nýjar og ferskar; ytri hluti greinilega aðskilinn með langar greinar S. flexuosum | |
| 38* | Engin skörp skil á milli innri ytri hluta kolls S. obtusum | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  1 |  1* |  4. |  4* |  5 |
|  6 |  6* |  8 |  11 |  13 |
|  14 |  14* |  22* |  24 |  24* |
|  25 |  25* |  27 |  27* |  28 |
|  28* |  30 |  32 |  34 |  34* |



37



37*